



Ein naturwissenschaftliches Volksblatt. Herausgegeben von E. A. Hoffmüller.

Wöchentlich 1 Bogen. Durch alle Buchhandlungen und Postämter für vierteljährlich 15 Sgr. zu beziehen.

Inhalt: Rechts und Links. Von Dr. Karl Klotz. — Alte und neue Zeit der Baumrinde.
No. 27. (Mit Abbildung.) — Der Wolf. Der Gase. Von Dr. Hermann Wollus. — Kleinere Mittheilungen. — Für Haus und Werkstatt. — Bei der Redaktion eingegangene Bücher.

1861.

Rechts und Links.

Von Dr. Karl Klotz.

Auf dem Exercierplatz standen die Rekruten, und nicht ohne ein Schaudern vernahm der Vorübergehende die Donnerworte, welche der Meister auf die Häupter seiner Schüler beschwor; was mochten sie wohl verbrochen haben? Sie hatten wieder ein Mal Rechts um mit Links um verwechselt; weiter Nichts. Weiter Nichts?! Die Spulknaben stehen da und lachen, wie kann man nur Rechts und Links verwechseln! Ja, und was fällt dir ein, daß du uns jetzt dergleichen Dinge aufstischst, — werdet ihr sagen, — wie hängt denn das mit der Naturgeschichte zusammen? O, leider näher, als es wünschenswerth wäre. Seht, liebe Leser, was die Botaniker Links um nennen, das nennen die Zoologen Rechts um; und diesen Jammer kann ich euch nicht länger vorenthalten.

Durch die Forschungen der Neuzeit sind wir soweit gekommen, alles Ernstes die Frage aufwerfen zu dürfen: giebt es überhaupt eine Grenze zwischen Thierreich und Pflanzenreich? und gleichwohl ist es möglich, daß die beiden Schwesterwissenschaften über einen Begriff, über den man sich eigentlich schon in der Elementarschule hätte sollen geeinigt haben, entgegengesetzter Meinung sein können. Es klingt ungläublich, aber es ist so; auch hier macht sich der alte Fluch der Sprachverwirrung geltend, der die Menschen seit dem Thurmbau zu Babel genirt hat.

Und du schämst dich nicht, werdet ihr mir vielleicht einwenden, einen Schandfleck deiner Wissenschaft so unum-

wunden vor uns aufzudecken? Nein, ich halte es sogar für Pflicht, die Mängel nicht zu verschweigen, sondern durch eine offene Darlegung vor der abscheulichsten Begriffsverwirrung zu warnen, in die ihr möglicherweise gerathen könntet. Der Wissenschaft aber, denke ich, geschieht kein Abbruch, die Confusion ist ihr nicht ungen, diese gehört vielmehr der Zeit, und wird und muß mit der Zeit beseitigt werden.

Verständigen wir uns nun, was der Zoolog unter Rechts um begreift, und wie der Botaniker dazu kommt, das Entgegengesetzte darunter zu verstehen. Stellen wir uns eine Wendeltreppe vor; sie kann so gebaut sein, daß man die Mittelsäule (Spindel) beim Aufsteigen immer mit der rechten Hand erfassen kann, sich also um seine rechte Seite dreht, mit andern Worten, die Sache aus der Vogel-perspektive betrachtet, dieselbe Richtung verfolgt, welche der Zeiger der Uhr beschreibt. Wir pflegen das Rechts um zu nennen. Steigt man dieselbe Treppe hinab, so — geht's Links um; soll es abwärts auch Rechts um gehn, so müßte man geradezu auf dem Kopfe laufen! Stelle ich mich dagegen vor der Wendeltreppe hin, und sehe zu, wie die Leute hinanstiegen, so sehe ich sie von der rechten nach der linken Seite aufsteigen; ich denke, dies ist klar. Der Techniker sagt mir, diese Wendeltreppe ist links um gedreht. Sehe ich nun eine Schlingpflanze sich um einen Stab winden, so finde ich hier ein ganz ähnliches Verhältniß: die

Schlingpflanze ist die Wendeltreppe, der Stab deren Spindel. Ich sehe, daß die Windungen von meiner Rechten zu meiner Linken aufsteigen, und ich sage, die Pflanze windet sich links. Denke ich mich freilich in die Pflanze hinein, bilde ich mir ein, ich wäre eine Schlingpflanze, und wände mich am Stabe empor, oder eine Amsel, die auf der Schlingpflanze hinanläufe, nun, so müßte ich freilich sagen, ich winde rechtsum. Ich kann mir auch einbilden, ich wäre die Spindel, und die Schlingpflanze schlänge sich an mir in die Höhe; dann ginge es ebenfalls von den Linken zur Rechten. Je nun, hier liegt das ganze Gerüthsel!

Die Botaniker denken bei Bestimmung des Rechts und Links in der Natur sich in den Gegenstand hinein, ihr Rechtsum entspricht also der Bewegung des Uhrzeigers; der Corporal denkt sich auch in seine Rekruten hinein, wenn er kommandirt, sie sollen Rechtsumkehrt machen; die Rekruten aber meinen — durchdrungen vom Gefühl der Subordination —, er fasse die Sache „zoologisch“ und betrachte sie nur als Objecte.

Wenn ich von dem Sprachgebrauche der Botaniker rede, so meine ich allerdings bei weitem die Mehrzahl, und die namhaftesten Autoritäten; gleichwohl giebt es einzelne Abtrünnige unter ihnen, welche die Sache „zoologisch“ (subjectiv), wie sich Alex. Braun ausgedrückt hat) fassen, — und hierdurch ist denn eine nicht geringe Confusion in der botanischen Literatur entstanden, — so daß man bei Vorformirungen der Drehungsverhältnisse sich stets erst orientiren muß, ob der Autor zur „Rechten“ oder zur „Linken“ gehört.

Es dürfte nun nicht ganz überflüssig sein, zu fragen, welche der beiden Bezeichnungswesen die naturgemähere sei? Gewiß werdet ihr mir gern zugeben, daß man von einem Körper, an welchem man eine rechte und linke Seite nicht zu unterscheiden vermag, — also etwa von einer Kugel oder von einem Cylinder — bei Umdrehungen nicht gut sagen kann, er drehe sich rechtsum oder linksom, sondern daß diese Ausdrücke lediglich für den davorstehenden Beobachter, der sich einer rechten und einer linken Seite zu erfreuen hat, von Bedeutung sind. Ein solcher Körper ist aber der Pflanzenstengel. Die Uebertragung der Verhältnisse des menschlichen Körpers auf ihn ist keine naturge-

mäßige, ist rein willkürlich; zudem ist sie eigentlich nur da möglich, wo sich der Körper um seine Achse dreht, in den meisten Fällen aber, wo Drehungen im Pflanzenreiche sich finden, liegt keine Achsendrehung vor, sondern nur eine schraubenförmige Bewegung oder eine schraubenförmige Richtung, die wir als Bewegung auffassen; die gesetzmäßige Anordnung gewisser Organe läßt sich — oft — auf Schraubentendenzen beziehen.*)

Auf Schraubenlinien aber läßt sich die Bezeichnungswesen der Botaniker nur dann anwenden, wenn die Bewegung von unten nach oben erfolgt; im andern Falle, dies sahen wir ja vorhin bei der Wendeltreppe, ist die Bezeichnung geradezu verkehrt. Stellen wir uns z. B. ein Spiralgefäß vor, — ihr Alle kennt es, — wir sind berechtigt, an ihm, im Bezug auf die Pflanze, der es gehört, ein Oberende und ein Unterende zu unterscheiden. Die schraubenförmige Verbindungsrichtung seiner Wand nennt der Botaniker, der Selbstverleugnung genug besitzt, sich in das Spiralgefäß hineinzubetenken, rechts-gewunden, wenn wir, davorstehend, die Windungen zur Linken aufsteigen sehen.

*) Daß ich hierbei die Blattstellung meine, sei nur angedeutet. Ich müßte zuviel einschalten, wollte ich diese Verhältnisse hierorts auseinanderlegen, und erlaube mir daher, auf einen zukünftigen Artikel zu verweisen, in welchem die Stellung der Blätter besprochen werden wird.

Wer sagt denn aber, daß diese Verbindungsrichtung in der Richtung von unten nach oben entsteht, also einer Bewegung von unten nach oben entspricht? Es ist sogar wahrschijnlijk, daß der umgekehrte Fall stattfindet! Den Zoologen, der den Gegenstand vor sich stehen hat, kann dies nicht stören, der Botaniker kommt, er mag es anfangen wie er will, in Confusion. Der Zoolog legt das Schneckenhaus vor sich hin, die Spitze sich zugewandt, mit der Mündung auf den Tisch; er findet, daß die Windungen von der Spitze aus nach der Mündung zu — und in dieser Richtung entstehen sie ja — von der Linken zur Rechten aufsteigen und er nennt das Haus rechtsgewunden. Er kann es auch umdrehen, immer steigen die Windungen von der Linken zur Rechten auf; dem Zoologen fällt es nicht ein, sich in das Schneckenhaus hineinzubetenken, und in den Umdrehungen von der Spitze vorzutreten bis zur Mündung. Ich will hier bemerken, daß die meisten Gehäuse rechtsgewunden sind; bei gewissen Gattungen und Arten (Clausilia, Physa) aber findet sich regelmäßig ein links-gewundenes Haus; bei Anderen (z. B. in der Gattung Helix) nur ausnahmsweise.

Sollte es, fragen wir nun noch, nicht rathsam sein, sich nur Einer der beiden Bezeichnungswesen zu bedienen, und welche von beiden soll dann beibehalten werden; soll der Botaniker nachgeben oder der Zoolog?

Allerdings sollte vernünftigerweise die Drehung um die Achse, die Schrauben- oder Schneckenlinie, die Spiralbewegung, in allen Zweigen der Naturwissenschaft eine gleiche Bezeichnung haben, und nicht in einer Disciplin — der Botanik — gerade entgegengesetzt aufgefaßt werden, als in den andern! Die so isolirt stehende Bezeichnungswesen der Botaniker aber ist, wie wir sahen, für die Mehrzahl der Fälle nicht eine naturgemäße zu nennen, und soll eine von beiden Parteien zurücktreten, so müssen es entscheiden die Botaniker, die obendrein erst seit De Candoles der alten, ursprünglichen Anschauungsweise Vater Linne's untreu gemorden sind. Professor Nägeli (in München) hat es neuerdings geradezu ausgesprochen, daß die Botaniker gezwungen seien, ihre Bezeichnung von Rechts- und Linksdrehung früher oder später zu verlassen, und sein Vorschlag, statt der fatalen Worte Rechts und Links eine

neue, von den Symmetrisch-gegenenden hergenommene Bezeichnungswesen einzuführen, dürfte vielleicht dazu beitragen, weitere Confusion zu umgehen. Eine senkrecht vor uns hingestellte Schraube nämlich steigt entweder von Süd nach Ost, Nord, West; oder von Süd nach West, Nord, Ost; im ersten Falle nennen wir sie südöstlich — und dies ist die linksdrehende Schraubenlinie der Botaniker, die rechtsgedrehte der Zoologen, — im letzteren Falle heißt sie südwestlich; dies ist die rechtsgedrehte Schraube der Botaniker. Es ist kein Zweifel, wir haben hier eine Bezeichnungswesen, welche dieselbe bleibt, mögen wir nun die Schraube von unten hinstellen, oder uns als Spindel hineindenken oder gar als Schraubenlinie in die Höhe drehen!

Wäre nun aber auch die Bezeichnung der Botaniker die naturgemähere, und stünde den Zoologen auch nicht die Einkimmung der übrigen Wissenschaften, sowie der Sprachgebrauch des gemeinen Lebens*) zur Seite, so müßten wir trotzdem den Zoologen ihre Veränderung lassen, da bei ihnen eine Reformirung einen unübersehbaren Unfug in der Nomenclatur herbeiführen würde, während es bei den Bota-

*) Ich habe wohl nicht zu fürchten, daß mich hier Jemand des Irrthums beschuldigen und an die Rekruten erinnern wird? Sie sind Subjecte, der Corporal, welcher vor ihnen steht, denkt nur auf sie.

nieren weiter nichts bedarf, als bei Erwähnung hierher gehöriger Verhältnisse sich jedes Mal klar auszusprechen, welcher Partei man angehört. Ich will übrigens mit meiner schlichten Darlegung nicht etwa eine Revolution hervorrufen, dazu wäre auch hier durchaus nicht der Ort,

ich habe vielmehr euch, liebe Leser, nur die Sache vorge-
tragen, wie sie ist, um euch vor der Confusion zu warnen,
und aber vor dem Vorwurfe, wir bräuchten immer nur solche
Geschichten, mit denen wir Parade machen könnten, und
schwiegen möglichst über die streitigen Punkte!

Alte und neue Zeit der Baumrinde.

Welche Entstehung und innere Gestaltung und welche Bedeutung für das Leben der Bäume, sowie auch überhaupt aller vollkommen entwickelten Pflanzen die Rinde habe, ist uns durch den ausführlichen Artikel des Herrn Dr. Klotz in Nr. 7, 8 und 9 dieses Jahrganges bekannt geworden. Wir wollen jetzt sehen, daß die Rinde auch für die Erdgeschichte eine Bedeutung hat, insofern wir natürlich die Entwicklungs Geschichte des Pflanzenreichs zur Erdgeschichte rechnen, so weit sich diese Entwicklungs Geschichte nach den versteinerten Ueberresten früherer Pflanzenwelten beurtheilen läßt. Bei der Umfänglichkeit der baumartigen Pflanzen ist es natürlich fast eine Unmöglichkeit gewesen, daß sich ganze Bäume ungetheilt in den Schichtgesteinen erhalten konnten; und wenn auch hier und da, wie wir bereits wissen, ganze versteinerte Baumstämme gefunden werden, so finden sich an denselben doch niemals die dazu gehörigen Blätter und Früchte, wenn wir die wenigen Fälle ausnehmen, daß an Stamm- und Zweigspitzen der Stein Kohlenzeit Blätter und Früchte noch ansitzend gefunden worden sind.

In den allermeisten Fällen finden wir die Stamm- und Wurzeltheile und die Blätter, Blüthen und Früchte von einander getrennt und zwar fast niemals in naher Benachbarung, so daß wir daraus ihre Zusammengehörigkeit abnehmen könnten, sondern meist von einander getrennt, so daß wir gar nicht wissen, welche Blattgebilde zu diesem oder jenem Stammgebilde gehören. Dabei kann es auffallend erscheinen, daß man häufiger und in größerer Mannigfaltigkeit die Blattgebilde findet als Stammtheile, mit denen möglicherweise jene in Verbindung gebracht werden könnten. Die zarten, leicht zerstörbaren Blätter früherer Pflanzenwelten sind in viel größerer Menge und Mannigfaltigkeit auf und gekommen als die festeren Stammtheile, letztere wenigstens nur selten in ihren erkennbaren Gestaltverhältnissen, da dieselben meist entweder zerstückt und fast immer entrindet, dem Versteinungsproceß unterworfen sind. Freilich ist hier nicht zu vergessen, widerlegt aber daß eben Gesagte nicht, daß es in der Hauptsache Baumstämme gewesen sind, woraus die unermesslichen Stein- und Braunkohlenflöße sich bildeten. In diesen ist aber nur in sehr seltenen Fällen das Zellgewebe noch erkennbar, so daß sogar ein noch lebender namhafter Naturforscher, um nicht mit der mosaischen Schöpfungsgeschichte ins Gedränge zu kommen, die Steinflöhen für Ablagerung ursprünglichen Kohlenstoffes erklärt. Der Umstand, daß wir nur selten wissen, wie vorweltliche Blätter und Stämme zusammengehören, verursacht einen lästigen Uebelstand in der Paläontologie oder Vorweltkunde, wie Volger ganz passend (nach dem Vorgang von Forzeit und Vorwelt) jenes griechische Wort übersezt, damit die Naturgeschichte derjenigen belebten Wesen bezeichnend, welche in der Vorzeit gelebt haben. Da es nämlich nothwendig ist, daß man auch die erkennbaren versteinerten Thiere und Pflanzen, wie die

lebenden, mit Gattungs- und Artnamen besetzt, so kommt man hierin bei der Namensgebung versteinelter Pflanzenreste in Verlegenheit. In einem Braunkohlenbecken finden wir z. B. in den wechsellagernden Sandstein-, Schieferthon- und Braunkohlen-schichten Blätter, Früchte und Stammtheile, in welchen letzteren mit dem Mikroskop das Holzgewebe oft noch sehr deutlich zu erkennen ist. Aber diese zerstückten Theile hängen nicht mehr zusammen, wir wissen also nicht, wie sie zusammengehören. Am häufigsten finden wir in dem angenommenen Braunkohlenbecken, besonders in den Sandstein- und Schieferthonschichten, die Blätter und zwar in solcher Vollkommenheit des Abdrucks, wie sie ein Siegel und das dazu gehörige Petschaft nur zeigen können. Wir sind demnach vollständig befähigt, die zu Tausenden vorliegenden Blätterabdrücke nach Arten von einander zu unterscheiden, wobei wir uns nicht beirren lassen von den kleineren Verschiedenheiten, welche die Blätter einer Baumart unter sich zeigen. Wir dürfen uns also berechtigt glauben, jeder Blattart einen besonderen Namen zu geben. Dabei kommen wir aber schon in eine Verlegenheit, indem wir nämlich nicht bestimmt wissen, wie weit die vorliegenden verschiedenen Blattarten zu verschiedenen Gattungen oder möglicherweise zu einer Gattung gehören; denn wenn auch das Gelehrte hierbei einige Fingerzeige an die Hand giebt, so wissen wir doch, daß es selbst an unsern lebenden Baumblättern nicht ausreicht, wir würden z. B. das Blatt der mexikanischen weidenblättrigen Eiche (*Quercus salicifolia*) durchaus nicht für ein Eichenblatt halten können, wenn wir es eben allein vor uns hätten. Nachdem wir uns durch unsichere Ermägung übel oder böse aus dieser Verlegenheit gewidelt haben, verfallen wir in eine andere, wir finden nämlich in denselben Schichten hier und da einzelne Früchte oder Samen und zwar entweder getrennt von den Blättern oder mit verschiedenen Arten derselben untermengt. Hier ist es nun zuweilen unmöglich zu entscheiden, ob und wie diese Blätter und Früchte zusammengehören, und nachdem wir den Blättern Namen gegeben haben, so haben wir jetzt dasselbe Mäkel, dies auch mit den Früchten zu thun, kommen aber dabei in die Gefahr, einer Frucht einen Pflanzennamen zu geben und einem Blatte einen Pflanzennamen zu geben, welche, ohne daß wir es wissen können, vielleicht einer und derselben Art angehören, wir octroyiren also der vorweltlichen Flora zwei Pflanzennamen, wo sie in der That bloß eine kennt. Die Grundlagen der Vorweltkunde sind nun einmal nicht immer die festesten! Erwogen wir das Getrenntsein der gefundenen Pflanzentheile einerseits, ihren oft höchst unvollkommenen Erhaltungszustand andererseits, bedenken wir ferner, daß ein Organ wie das Blatt an verschiedenen Theilen der Pflanze — oft wenigstens — unter ganz verschiedenen Formen auftritt, daß es bei gewissen Pflanzen — ich brauche nur den Maulbeerbaum zu nennen — ganz gewöhnlich, man kann wohl sagen willkürlich mit den Form-

verhältnissen spielt, bei andern — hier will ich nur an den Cypern erinnern, wenn er blüht; an den üppigen Stodaus-
schlag von Linden etc. — doch wenigstens zu Zeiten und
unter gewissen Lebensverhältnissen eine totale Umgestal-
tung erfährt, so muß man es ganz natürlich finden, daß
jeder Akephor Braun hierüber folgendermaßen aussprechen
konnte: „Während man unbekannte lebende Pflanzen,
so lange Blüthe und Frucht nicht zu Gebote stehen, in der
Regel unberücksichtigt bei Seite legt, wagt man bei den
fossilen Pflanzen Familie, Gattung und Art nach bloßen
Blättern, ja nach Fragmenten von Blättern zu be-
stimmen. Bei der Wandelbarkeit der Blattformen in einer
und derselben Familie ist es dann freilich nicht zu verwun-
dern, wenn selbst über vollständig bekannte fossile Blätter
die Ansichten sehr verschieden sind; wenn dasselbe Blatt für
Giehe oder Weide, Rhamnee oder Laurinee, Myrtace oder
Proteacee u. s. w. gehalten wird.“ Ein ganz ähnliches
aber ist es auch mitunter bei den fossilen Stämmen oder
Stammtheilen. Sie sind gewöhnlich durch den Druck
mächtiger Gesteinsmassen flach, breitetartig zusammengebrückt;
nur bei noch aufrechter Stellung befielen sie ihren ursprüng-
lichen cylindrischen Umfang. Was übrigens diese aufrechte
Stellung betrifft, so ist hierunter zu verstehen, daß die
Stämme die Schicht, in welcher sie begraben sind, recht-
winklig durchsetzen, so daß sie also, wenn diese Schicht eine
Verwerfung erfahren hat, immerhin auch eine mehr oder
weniger schräge Stellung einnehmen.

Man hat Stämme von mehr als 30 Fuß Länge ge-
funden, und am Püßberge bei Bonn einen aufrecht stehen-
den Stamm von zwölf Fuß Durchmesser! Von diesen
Stämmen ist, besonders in der Steinkohlenformation, sehr
oft nur die in Steinkohle verwandelte Rinde erkennbar,
während das innere Gewebe des Stammes zerstört und der
Hohlraum durch Sandstein, Schieferstein oder andere Ge-
steinssubstanz erfüllt ist. In dieser Ausfüllung finden sich —
beiläufig erwähnt — sogar nicht selten auch Theile ganz
anderer Pflanzen vor! — Wir können uns also bei solchen
Stämmen oder Stammtheilen nur an diejenigen Merkmale
halten, welche uns die Rinde bietet, während wir bei an-
deren wirklich versteinigerten Baumstämmen (vergl. Jahrg. II,
711) die Zellen des Holzkörpers gar wohl noch zu erken-
nen und aus ihren Verhältnissen den betreffenden Pflanzen-
resten mit mehr oder weniger Sicherheit die Stelle anwei-
sen können, die ihnen im System zukommt.

Es dürfte nicht ganz uninteressant sein, ein Mal ein
Paar der wichtigsten fossilen Stämme etwas näher zu be-
trachten!

Besonders interessant wegen ihres außerordentlichen
Reichthums an Pflanzenteilen und nebenbei auch wegen
der praktischen Bedeutung dieser Reste ist die Steinkoh-
lenformation. Freilich sind diese Pflanzenmassen, so
welt sie nämlich die Kohlenflöße selbst zusammenfassen,
zum größten Theil in der Weise zusammengebrückt und um-
geben, daß oftmals alle und jede Artenbarkeit einer
Form verlohrt ist; wenn auch nicht so oft als man früher
annahm, denn wir wissen durch Göppert, daß auch mitten
in der Steinkohle Pflanzenteile, und zwar besonders
stammartige noch wohl erkennbar sind, so daß sich denn in
deutschen Kohlenflößen bereits über achtzig Pflanzenarten
innerhalb der Kohle selbst nachweisen ließen.

Zunächst muß ich anführen, daß die Calamiten eine
sehr allgemeine Verbreitung besitzen; ihre meist platt ge-
drückten Stämme zeigen eine quere Gliederung und zahl-
reiche Längsfurchen; sie und ihre Verwandten, die Equis-
setiten, werden in der Jetztwelt durch die Schachtelhalme
(Schachtelhalm, Equisetum) ersetzt, welche allerdings nur

ein bescheidenere Längenmaß erreichen als ihre riesigen
Vorältern, denn man hat Calamitenstämme von 40 Fuß
Länge und 3 Fuß Dicke gefunden, und auch die Equisetiten
erreichen die Größe eines mäßigen Baumstammes.

Farnstämme, charakterisiert durch große, quincuncial-
gestellte Blattnarben, welche in der Form ihres Umrisses
und der auf ihrer Fläche sichtbaren — bekanntlich von den
in das Blatt (bei den Farn in den sogenannten „Webel“)
austr tretenden Gefäßbündeln gebildet — Zeichnung gute
Unterscheidungsmerkmale bieten, sind in der Steinkohlen-
formation keineswegs so häufig, als man früher annahm,
indem man noch andere Stämme (Sigillarien) für den
Farn zugehörig hielt. Man hat die Farnstämme mit be-
sonderen Namen belegt, da man nicht weiß, zu welchen von
den zahlreichen nach den Blättern gar wohl unterschiedenen
Arten sie gehören mögen. Von der größten Wichtigkeit
dagegen und in manchen Steinkohlenterritorien in großer
Menge angehäuft sind die gewaltigen Stämme der Sigil-
larien und der ihnen verwandten Eyringobamben; be-
sonders doch z. B. in Oberpfälzer Kohlenflöße meist aus
Sigillarienstämmen! Außer den Sigillarien sind die
Stigmarien, Lepidobamben und Martrien von be-
sonderer Wichtigkeit für die Steinkohlenformation.

Die genannten Pflanzen kommen nicht allein in bedeu-
tenden Massen vor, sondern es sind auch zahlreiche Arten
— von Sigillarien allein schon 67 klar unterscheidbare
— von ihnen beschrieben worden. Das Unterscheidungs-
merkmal bietet die — Rinde. Hauptächlich auf ihre Sculp-
tur und die Gestalt und Anordnung der Blattnarben
stützt sich die Sonderung dieser verschiedenen Gattungen
und Arten.

Die Sigillarienstämme finden sich, bei einigen
Fußen im Durchmesser, von 30 — 60 Fuß Länge; ja in
Nordamerika hat man sogar 100 Fuß lange Stämme ge-
funden; doch sind dies im Ganzen immer nur seltene Fälle
und daß bei Weitem gewöhnlicher Vorkommen bilden kurze
Stammstücke. An diesen Stämmen und Stammstücken
aber ist nur noch die Rinde zu erhalten, welche jedenfalls eine
nicht geringe Festigkeit besessen haben mag. „Voll bemerkt,
daß die Rinde der meisten großen stammartigen Pflan-
zen der Kohlenformation sehr dauerhaft gewesen sein
müsse im Vergleich zu ihrem Innern. Auch komme dieselbe
Verschiedenheit der Erhaltungsfähigkeit bei vielen jetzigen
Baumarten vor. So besitze z. B. *Botula papyracea* in
den Wäldern Neuschottlands eine so zähe und dauerhafteste
Rinde, daß ihr Stamm oft äußerlich noch ganz gesund und
frisch erscheint, während doch alles Holz bereits ausgefault
ist. Die in den Moorflößen stehenden und submergen
Stämme sind dann bisweilen mit Schlamm gefüllt, gerade-
so wie die fossilen Sigillarienstämme der Vorwelt.“ (Nau-
mann, Lehrbuch d. Geogn.)

Die innere Gewebemasse der Sigillarienstämme besaß
jedemfalls nur eine geringe Festigkeit, sie ist meistens zer-
stört und der Hohlraum mit Gesteinsmasse ausgefüllt.
Wir haben es also bei einer solchen Sigillarie im Grunde
nur mit Rinde zu thun, wie wir bei einem ausgeklopften
Thier nur einen Balg vor uns haben; können und also nur
an die Rinde halten, und nur solche Merkmale sehen, welche
diese uns bietet. Wir finden ihrer Oberfläche meist sehr regel-
mäßig cannelirt, so daß parallele glatte Keilen durch schmale
Furchen getrennt werden. Auf diesen Keilen sitzen Narben
wie Siegel, — daher der Name Sigillaria —, sie sind
sehr regelmäßig quincuncial angeordnet und verschiedenes ge-
staltet. (Ich muß hier betonen, sie sind nicht unterends zu-
gespitzt und gekielt, wie bei den Lepidobamben!)

Bei einigen Arten stehen diese Narben so dicht bei-


sammen in senkrechten Reihen, daß von einer Cannelirung gar nichts mehr zu sehen ist. Auf den Narben aber sieht man, wie dies vorher bei den Farnstämmen erwähnt wurde, die (drei) Austrittspunkte der Gefäßbündel. Man nimmt ganz allgemein an, daß diese Narben Blattnarben seien, war aber nur in seltenen Fällen so glücklich (Brongniart, Göppert, Goldenberg), die schmalen, linearen, parallelverlaufenden Blätter ihnen wirklich auffindend zu finden. Bei entrindeten Steinkernen sieht man statt der „Siegel“ nur kleine, punktförmige oder lineare, einfache oder doppelte Narben. (Fig. 1.)

Man hat sich viel Mühe gegeben, zu entscheiden, welcher Abtheilung des Pflanzensystems die Sigillarien wohl angehören möchten, Ring erklärte sie für Farn, Brongniart, der an einem wirklich versteinerten Sigillarienstamme die innere Struktur zu untersuchen vermochte, glaubte sie als

späteren, glücklicheren Kunde als an einer und derselben Art vorkommend ergeben konnten; wie denn z. B. die Narben von vier durch Brongniart unterschiedenen Species später von Binney an einem und demselben Sigillarienstamme aufgefunden wurden!

Die Stigmarien tragen auf ihrer Oberfläche freie, runde, quincuncialgestellte Narben, denen bisweilen faserähnliche Anhängsel aufsitzen. Sie erreichen bei dichtotomer Verzweigung und sind mehr oder weniger horizontaler Lage oft eine bedeutende Größe: Ryell sah in einem Kohlenwerke Pennsylvaniens einen 3 Zoll dicken Ast von 45 Fuß Länge!

Auf Grund eines in einem Kohlenwerke bei Liverpool aufgefundenen interessanten Exemplars einer aufrechtstehenden Sigillarie mit allseitig auslaufenden Wurzeln, welche vollkommen den Stigmarien gleichen, deutet man die



1. Stück eines Stammes von *Sigillaria* (besser *Syringodendron*) alternans Sternb. aus der Steinkohlenformation, u. zwar ein Steinern, dessen Sculptur also den Abdruck der Innenseite der nicht mehr vorhandenen Rinde zeigt. Den (Fig. 2 vergr.) poartigen Austrittspunkten der Gefäßbündel haben auf der Rinde große „Siegel“-ähnliche Blattnarben entsprechen. 3. *Sagenaria dichotoma* Sternb., ebenfalls aus der Steinkohlenformation (Fig. 4 vergr.). Die *Sagenaria* gehören mit den *Lepidobendren* zu den *Equisetaceen*. Vergleichsweise sehen wir je ein entfaltetes Fingerringel mit einer vergrößert darunter gezeichneten Rinde: 5. von der *Wagelkieser* (*Pinus Mughus* Scop.), 6. von der Tanne, und 7. von der Fichte.

den Cycadeen verwandt bezeichnen zu müssen, während sie neuerlich von Goldenberg, der so glücklich war, zapfenförmige Fruchtstände aufzufinden, als baumartige Isoëten (also *Cryptogamen*) gebräut worden sind.

Sehen wir jedoch hiervon ab, und halten nur das im Auge, was uns die Rinde zu bieten vermag, so dürfen wir, immerhin zugegeben, daß wir in den Blattnarben in Ermangelung eines besseren ganz leidliche Merkmale besitzen, doch ja nicht vergessen, daß gerade so wie bei den Pflanzen der Jetztzeit die Gestalt der Blattnarbe an einer und derselben Pflanze, ja an einem und demselben Exemplar, bis zu einem gewissen Grade wenigstens — schwankt, dies auch bei den Pflanzen der Vorwelt der Fall war, so daß es uns also nicht wundern darf, daß Formen, die — einzeln gefunden — vorläufig als verschiedenen Pflanzenarten zugehörig gehalten werden mußten, sich bei einem

Stigmarien als Wurzeln von Sigillarien, wenn auch in der Mehrzahl der Fälle ein Zusammenhang nicht mehr nachweisbar ist, so daß denn auch manche Forscher die Zusammengehörigkeit in Frage stellen. Wir dürfen eben nicht vergessen, daß wir uns auf einem etwas schwankenden Boden befinden.

Ich erwähnte schon vorher, die *Lepidobendren* besäßen zugespitzte und gefiederte Blattnarben; diese Stämme kommen ebenso häufig vor, wie die Sigillarien, man hält sie für baumartige *Lycopodiaceen* (also ebenfalls *Cryptogamen*). Blätter finden sich nicht selten, dergleichen auch zapfenartige Früchte, welche man auch, wenn sie abgelöst gefunden werden, als *Lepidostrobus* bezeichnet hat.

Die Stämme der *Rhorrien* endlich sind mit kurzen, kegelförmigen oder dornförmigen Höckern bedeckt, die man früher irrig für die Blätter hielt, bis — zuerst durch Steininger

— nachgewiesen wurde, daß man immer nur entrindete Steinkerne vor sich gehabt, und daß berindete Exemplare eine glatte Oberfläche mit ganz kleinen runden Narben zeigen, die den Spizen jener Höcker entsprechen.

Mühe indeß das Vorgeführte genügen! Wir haben gesehen, daß wir bei einer bedeutenden Anzahl von Fällen in Ermangelung anderer Merkmale gewisse Theile fossiler Pflanzen einzig nach etwaigen Oberflächenverhältnissen der Rinde unterscheiden mußten — und mit mehr oder weniger Sicherheit auch konnten —, müssen aber gestehen, daß, wenn uns schon bei den — immerhin colossa-

len, so doch — niedrig, d. h. einfach organisierten Pflanzen- gestalten der Vorwelt — besonders Kryptogamen — die Wandelbarkeit der Blattnarbe mitunter bei unserem Unterscheiden im Stiche ließ, wir gar schlimm berathen sein würden, wenn wir, ich will sagen ein Stüd Gassenkamm einzig nach der Oberflächengestaltung seiner Rinde bestimmen sollten, ohne Zuhilfenahme noch erkennbaren Holz- körpers, ohne beigelegte Blätter oder Früchte! Nur so lange am jungen Zweig die Blattnarben noch zu erkennen sind, vermögen wir aus ihnen und der durch sie bezeich- neten Blattstellung — vielleicht annähernd eine richtige Antwort zu geben!

Der Wolf.*)

Obgleich kaum von dem Hunde unterschieden, ist der Wolf (Canis lupus) doch dessen grimmigster Feind. Er gleicht ganz einem großen Hirtenhunde, selbst in der schmutzig- gelblichen Farbe, wie er denn vor Alters auch wohl „Holz- hund“ genannt wurde; aber das gedrückte Kreuz und der schiefe rüdliche Blick (der Wolfesblick!) geben ihm den Cha- rakter schleichender, hyänenartiger Wildheit. Er ist das gierigste und nach dem Bären das stärkste unserer Raub- thiere. Derb, dürr, ganz Knochen und Sehne, hat die zäh behende Gestalt keine Unze überflüssiges Fleisch; aber alle seine Sinne sind auf den Fraß geschärft: sein ausgerichtetes Ohr hört aus weiter Ferne das über den Schnee eilende Renn, sein ruheloßes Auge leuchtet in der Nacht mit rothen Ringen, sein Geruch wittert das Pferd und den Reiter in der Steppe. Auf den langen schwarzgestreiften Beinen jagt er gestreckten Laufes so schnell und dauernd, daß kein Windhund neben ihm aushalten würde; dabei blühen aus dem weiten Nacken die großen Fangzähne, und die Zunge hängt lang und schnaufend hervor. Alles muß seiner Un- ersättlichkeit zur Beute dienen; wenn der Hunger ihn quält, frisst er Mäuse, Kröten, selbst Erde, scharrt schafalähnlich das Waß hervor; doch seine eigentliche Nahrung bilden Heerdenthier und Wild. Wie gefräßig er ist, beweist unter Anderem eine Anekdote Kobells, nach welcher ein einziger Wolf, dem man 9 Jahre vergebens nachstellte, in dieser Zeit gegen tausend Schafe und zahlreiche Fische und Rehe zerriß. — Mit Einem Sprunge wirft er sich an die Kehle des weidenden Pferdes und reißt es zu Boden. Die Todes- wunde fließt weit und scharf, wie von der Schneide eines Rasirmessers, und so groß ist die Muskelkraft seines übrigens steifen Halses, daß er selbst das gewürgte Glienkhier weite Strecken im Nacken davon schleppt. Wenn er sein Eisen- geriß zusammen schlägt, glaubt man fast den Schuß eines Tergers zu hören. Blümenlein versetzt er den Sprung, dann packt er das aufbaumende Thier in den Weichen und jagt das zum Tode verwundete, das mit nachschleifenden Eingeweiden oft noch Stranden lang rennt, bis es endlich unter seinen Pranken zusammenbricht. Im Angesicht des Schäfers reißt er mitten aus der Herde das Schaf; er setzt heulend dem Schlitten des Reisenden nach und springt nach Menschenblut dürstend, am Reiter hinaus. Während

des Winters dringt er frech in Stall und Wohnung des Landmannes; ja selbst in den Straßen von Petersburg hat man ihn gejagt. Aber nur der Hunger macht ihn fähig. Dem Muthigen gegenüber ist er feig und verläßt sich mehr auf seine List als seine Stärke. Stunden lang liegt er im Grase und belauert das neben der Stute tappende Hüllen; auf dämmern den Waldstegen sperrt er dem Wanderer den Weg; umschleicht auf der Heide den Karren des hausfreundlichen Israeliten. Ist günstige Gelegenheit des Angriffs, so duckt er den spießschnauzigen Kopf, drückt die Augen glosend aus der Höhle, sträubt das Haar, krümmt den Rücken und stößt, auf seine Beute stürzend, ein wildes gurgelndes Geheul aus. Zieht er sich zurück, so weicht er fast kriechend, und vermischt mit dem buschigen, immer hängenden Schweisse die Spur, bis er, sicher genug, in großen Sähen seinem Lager zuflieht. Offenen Kampf meidet der Wolf; er wird nur wider Willen in denselben verwickelt. Er scheut den Fuß des Hengstes und das Horn des Stieres, und flieht vor dem Steppenhunde, der die Schafherde bewacht. Ein Funke, ein rauschendes Blatt kann ihn in Furcht setzen; ein ungewohnter Ton, das Spiel einer Geige, das der arme Muskant in seiner Seelennoth vor dem grimmen Auditorium anstimmt, hält sie wie im Bann, bis sie, vom Schrecken übermannt, davonlaufen. Seine Raubgier, obgleich sie ihn oft der Voracht vergessen läßt, macht den Wolf doch auch der hartnäckigsten Verfolgung fähig. Unab- läßig drängt er der Spur der Herde nach, jedes franske Stüd ereilend; aber noch furchtbarer und elter erscheint er im Gefolge des Krieges und der Schlachten. Der Wolf ist der mordende Nachzügler der Heere, und nicht begnügt, wie der Raub, auf der Wühlstatt das graue Mahl zu hal- ten, überfällt er schaarenweis den einsamen Posten und den rückbleibenden Zug der Matten und Leichen. Herisultha, „die Meeresschnelle“ heißt eben deshalb die Wölfin in der be- zeichnenden Sprache der altheutschen Thierfage. Im un- ermüdblichen Wettlauf setzt die Kette hinter dem Reiter ein, wie Byron es so erschreckend als wahr beschreib:

„Wir rauchten, wie ein Wind durch's Laub,
Beraus den Wölfin, die auf Raub
Ausjagten. Wohl datt' ich vernommen
Bei Nacht ihr Heulen; nah gekommen
Bei unserm Rücken ihre Schaar;
Zur langer Geklop wohl kenntlich, var.
Sie folgten uns, wohin wir fluch'n,
Sie boten selbst dem Morgen Sohn —

*) Dies und das Folgende ist aus dem am Schlusse dieser Nummer angelegten Buche von Dr. Hermann Müller, die Thierwelt, entnommen.

Bei Tagesanbruch im Wald ich sah
Sie uns auf eine Ruthe nah;
Die ganze Nacht der Füße Tappen
Halt' ich gehört unheimlich klappen."

Wen möchte befremden, daß ein solches Thier vor anderen gefürchtet und abergläubisch gefürchtet wurde? Wie den Namen des Bären, so wagte man auch den seinigen nicht geradehin auszusprechen, glaubte vielmehr, daß dies allein schon genüge, den Wolf herbeizurufen. Daher das Sprüchwort: Wenn man den Wolf nennt, kommt er gerennt. Noch bedeutungsvoller ist die Stellung, welche er in alten Nothen einnimmt. Wird doch, nach skandinavischer Sage, am Ende der Zeiten Fenrir, der große feuerjüngige Höllewolf, den Gott der Götter (Odin) selbst verschlingen und damit die Lichtwelt in den Abgrund stürzen. — Ginst noch zur Charakteristik des Wolfes! Kein Vierfüßler, selbst kein Wasservogel soll vom Fleisch desselben freis-

sen; aber dem vermundeten folgen Seinesgleichen auf der Blutspur, tödten ihn vollends und freßen ihn auf. Es giebt kein treffenderes Symbol der wilden Gier als den Wolf, und der Räuberhaas des Romulus hatte Recht, dieses Thier zum Wehr- und Feldzeichen zu nehmen. — Der Wolf findet sich in der ganzen alten Welt von Aegypten bis Lappland, ist aber in den civilisirten Ländern von Mitteleuropa und auf den britischen Inseln ausgerottet. In England war er ehemals so häufig, daß der für vogelfrei erklärte wolfshead genannt ward: Wolfshäuf, der vor die Wölfe verworfen. Auch in dem polarcischen Nordamerika begegnet man der Wolfshäuf am Ufer jedes Sees, jedes Flusses, und allnächtlich klingt der heulende Chor um das Lagerfeuer der Reisenden. Die Wölfe graben dort, wie auch in den russischen Steppen, Höhlen und Bäume mit Fuchstropfen, ähnlich den Fuchsbauten.

Der Hase.

Endlich sei das vielverbreitete Geschlecht der Hasen erwähnt, mit den zu Sprung und Lauf gestreckten Hinterfüßen, den beweglichen, immer horchenden Ohrlöffeln und der merkwürdigen Verdoppelung der oberen Schneidezähne, deren stets zwei hintereinander stehen. Ihre berühmte Fuchstamkeit (*Lepus timidus*) zeichnet der persische Spruch: „Wenn der Hase schläft, ist's ihm ein schwer Geschäft, und wenn er wacht, ist er voll Sorgen und Bedacht.“ Wir haben uns gewöhnt, mit dieser Eigenschaft den Begriff der Stupidität zu verbinden, und in unserer Thierfabel wird der thörichte Lampe überall das Opfer von Reineke's listiger Sippe. Doch ist diese Voraussetzung wohl nicht begründet, wenigstens es uns immer befremdlich erscheint, daß die Stammen der Hasen als ein Thier von außerordentlicher Verschlagenheit verehren und ihm die Rolle unseres Fuchses übertragen. Die Sitten des brotligen Wesens, seine Tangleistungen zur Kammelszeit, seine Abweichungsfähigkeit sind ebenso wohlbekannt, als sein zartes Fleisch beliebt. Schon Martial sagt: inter quadrupes matas prima lepus. Freilich hatten die Alten dabei noch den besondern Glauben, dieses Fleisch verleihe — mindestens auf einige Tage — Schönheit, und er ist kein Hasenfleisch! (*leporum non edit*) bedeutete geradezu so viel als: er ist häßlich. Den Orientalen gilt der Hase dagegen noch heute wie zu Wolffs Tagen für „unrein“, sein Aergerniß auch dem deutschen Volksglauben für unheilbringend. — Das höhlengrabende Kaninchen (*Lepus cuniculus*) ist gleichsam das „Demi-

nativum“ des Hasen (griech. lagidion), aber in der Lebensweise sehr von denselben unterschieden. Seine Fruchtbarkeit ist mit Recht sprichwörtlich geworden. Ein einziges Paar soll sich in vier Jahren auf 1,200,000 Stüd vermehren können, und Plinius erzählt, daß die Bewohner der Balearen selbst militärische Hülfen gegen die überhandnehmenden Thiere anstießen, und daß ganze Schiffsladungen derselben in die Hauptstadt gebracht wurden, wie etwa noch jetzt die Flandrischen Kaninchenzüchter aus Gent, Ostende, Brüssel u. s. w. allwöchentlich 50- bis 100,000 Stüd nach London liefern. Strabo hält Spanien für das eigentliche Stammland derselben; Andere die Gylladen. In der That beherbergen die millionenfach zerklüfteten Felsen dieser Inseln (besonders Mykonos und Delos) ungläubliche Massen; wobei jedoch die Erscheinung übertrifft, daß auf solchen Kanincheninseln nie Hasen vorkommen, während auf anderen nahegelegenen und gleich felsigen Eilanden des Archipels wiederum nur Hasen leben, ohne daß auch nur ein einziges Kaninchen gefunden würde. So ergänzen und trennen sich zugleich in seltsamer Weise die verwandten Geschlechter. Bei Sonnenuntergang schließen die Kaninchen geräuschlos hervor und gießen die ganze Nacht ebenso stumm ihrer Nahrung nach; ihr Auge ist schwach, allein desto schärfer ihr Gehör, so daß das Knirschen eines Schuhnagels auf dem Sande genügt, ihnen den Jäger zu verrathen.

Kleinere Mittheilungen.

Der Rhein als deutscher Eroberer. In Baden sind Ruinen von der bis gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts im Ullaß am linken Rheinufer belegenen Stadt Rheinau aufgefunden. Letztere, von dem Rhein mehrmals zerstört, wurde zuletzt von ihm verschlungen. Der Rhein hat inmittelst seinen Lauf so verändert, daß die geachteten Ruinen gegenwärtig am rechten Ufer des Stromes liegen. — Wird vielleicht Louis Napoleon sein ehemaliges Territorium reclamiren? (Zeitschr. des Arch. u. Ingen. Ver. f. d. R. Hannover aus Börsers Allgem. Bauzeitung.)

Eine merkwürdige Eigenschaft des Eisens. Bei

Spithead in England sind vor Kurzem Kanonen und Angeln des 1545 gesunkenen Schiffes „Mary Rose“ vom Meeresgrunde heraufgehoben worden. Die metallenen Kanonen zeigten, nach 292 jährigem Liegen auf dem Meeresgrunde zellige, höhligenartige Vertiefungen. Die schmiedeeisernen Kanonen waren nur $\frac{1}{4}$ Zoll tief gerostet. Die eisernen Angeln aus den Geschützen wurden, als sie an die Atmosphäre kamen, allmählig rothglühend, bekamen Risse und zerfielen in Stücke, ähnlich wie ausgetrocknete Thon zerfällt. (Artigan.)

Gesunde Wohnungen und die fehlerhaften Einrichtungen der Wohnungen der arbeitenden Klassen, ist die Ueberschrift eines sehr interessanten und lehrreichen Vortrages von Henry Robert, Mitglied der Rabies Sanitary-

Asociation, welcher im Bailler, 28. Juni 1860, mitgeteilt ist, in welchem eine vollständige Abrechnung über diesen Gegenstand genannt werden kann. Wie ersehen aus dem Vorstehenden, daß die Assestas der sanitären Verbesserungen in den größten Städten Englands die günstigsten sind. In London hat sich in den letzten 10 Jahren die Sterblichkeit von 25 zu 23 auf 1000 vermindert, in Glasgow von 28 zu 22 und in Liverpool von 39 zu 27, pro 1000. Man hält das normale Verhältniß für 17 auf 1000. In Hospitälern hat nach Einführung einer mäßiger Ventilation die Sterblichkeit von 1 auf 8 Kranke sich zu 1 auf 20 Kranke vermindert. Stürider geben Miß Richtigkeits' Notes on the Sanitary Condition of hospitals, interessante Aufschlüsse. Eine edlante Erfrabung über den Werth der Ventilation hat man in Glasgow gemacht. In einem Häuser-complex, die „Baracken“ genannt, kamen unter 500 Personen 57 Verrenkerkrankfälle vor und innerhals des ganzen Jahres etwa 100 Fälle. Der Arzt densifizierte jeden Raum, indem er ein Rohr aus dem oberen Theile derselben mit einem nahegelegenen Kaffelschornstein in Verbindung brachte. Das Resultat war, daß in 8 Jahren nur zwei Verrenkerer vorkamen. Erfrabungs-gemäß sollen die Escallenen von Arbeitsbühnen, Gefängnissen u. s. w. 450 bis 500 Cubitus Raum erforderlich sein. Nach Miß Richtigkeits' hält man in Paris für Hospitäler 1700 Cubitus, in London 2000, selbst 2500 Cubitus für wünschenswerth. Die Zellen in dem Muttergefangenisse Pentonville hielten 800 Cubitus. Für jeden Polizeigenhaber sind in den Stations-bühnen 50 Fuß, bei 9 Fuß Höhe der Zimmer also 450 Cubitus vorgeschrieben. In einem Bericht des Regierungs-commissärs werden in Cafetern statt 500 Cubitus pro Mann 700 bis 800 Cubitus empfohlen.

[illegible]

Telegraphen-Masten. Die Drähte des elektrischen Telegraphen zu Komoro im Rußland sind von hohen Masten mit 1700 Fuß Schrotbreite über den Klümen gespannt. In Paduchak in Kentucky sind die Drähte in 2 Weiten von respective 3720 und 2400 Fuß über den Höhe gespannt. Für diese große Weite sind die Aufhängewunkte 339 Fuß über Wasser, wobei einer der Masten 307 Fuß hoch ist. In Cape Girardeau in Missouri überspannt der Draht den Mississippi in einer Weite von 3720 Fuß. Die Aufhängewunkte sind 300 Fuß über Wasser, die der Masten jeder 200 Fuß hoch sind und die über 100 Fuß über Wasser steht.

Kartoffelkrankheit. Nach Martellière schützt man die Kartoffeln durch folgendes einfache und wirksame Mittel vor der Krankheit, die sie seit 1847 heimlich. Man treibt die Schafe auf die Kartoffelfelder gleich nach der Blüte (Mitte August), läßt sie darauf das erste Mal etwa zwei Stunden lang, dann eine Stunde, nachher eine halbe Stunde täglich — bis Ende August: man schützt sie auch noch während des Septembers ein Paar Mal hin. Der Schäfer darf dafür zu sorgen, daß sie über das ganze Feld treiben. Hundert Schafe können 4 Hektaren Kartoffeln schützen. Die Kartoffeln in den Gärten düngt man mit Schafmist. Während fünf aufeinanderfolgender Jahrgänge wurde dieses Mittel mit completem Erfolg von Gollard in Malignés angewandt. Um seine Erfahrung sicherzustellen, trieb Gollard 1860 die Schafe nicht auf die Kartoffelfelder: sie gingen zu Grunde! (Cosmos, X, 18.)

Wie erkennt man an einem gleichförmigen Stüde

Zugangsfloß das obere und das untere Ende. Nach einer Gräblung im „Anland“ theilt Prof. Mödler in den „Krit. Blatt. I. Fortz.“ u. „Zugriff“ blauer Folgendes mit: Zwischen zwei weltlichen Köpfen herrsche längere Zeit Streit und Uneinigkeit. Da sei es einmüthig dem einen ein, zu prüfen ob der andere einen weisen und scharfsinnigen Minister beſitze oder nicht. Zu diesem Zwecke ſchicke er ſeinem Gegner ein Minister laſes (einmal) und ſeiſe ſich gleichſamſam die Diefenſtrichſchneidung, ohne Knecht, ohne Knecht, und ohne eine Spur von Art und Sandel, mit der Aufforderung das obere und das untere Ende des Felzes zu beſtimmen.

Der König und seine Minister versammelten sich zur Untersuchung, aber völlig ohne Erfolg. Da fragte einer der Minister seine durch selbsteignende Bekanntheit berühmte Schwägerntochter um Rath. Sie erwiderte: „das ist äußerst leicht, fraget das Holz in dem Wasser; das Versinkende wird sich ein wenig senken, während das obere Ende sich über dem Wasser erhält.“ Die Probe ergab sich als richtig, und der Schwägerntochter der kranken Frau erhielt von dem König wertvolle Geschenke.

Wertverdienstweise ist nun, was diese uralte indische Frucht besaß, vollkommen richtig und durch Erfahrung aus der Praxis bestätigt. Mit wenigen Ausnahmen (Spez. 4. B.) fällt nämlich das spezifische „Trockengewicht“ bei weitem den meisten Bäumen vom Fuß zum oberen Schaft in merklichem Grad und es wüchse demnach Santelholz (*Pterocarpus santalinus* L.) mit in die Kategorie gehören.

Für Saug- und Fertigst.

Ritt zum Vertheilen für Defen. Vorgefchlich ist: 4 Theile Rehm und 1 Theil Borag wohl gemischt. Risse kann man vertheilen mit feinstem feinem Braunstein, der mit Wasser glas an einer feinsten Masse verarbeitet ist. Dieser Ritt wird so hart wie Eisen. (Reitfch. v. Arsch. u. Zugen. Ver. in Hannover.)

Annalith — verdeutschet Anna-Stein — ist ein neues Baumaterial, über welches ein von den Gründern (Dr. Busse und Professor Dr. v. Langenbeck) Geft. vom 22 Seiten (Der Annalith als neues Baumaterial, Leipzig 3. G. Gmüldersche Buchh. 1860) veröffentlichte Ausficht — ausficht. Die Maffe beftcht aus Hauptfätsen aus Gyps und Quarzstein, und man vermerkt sehr entzweier in der Form vorergrößerer Steine, die man gleich als gleich anfehen können ganze Mäße und dergl. Wo der Transport den Preis des Gypses (8 Gr. pro Etr. auf der Annen-Wäde b. Obersee am Hory) nicht all sehr erhöht, da ist unanfechtbar diese Mifchung die den bekannten vortrefflichen Eigenschaften des Gypses in Bauwerken aller Art sehr empfehlenswerth.

Bei der Redaktion eingegangene Bücher.

Die Tierwelt, Charakteristiken von Dr. Hermann Waßius, Dir. der Realschule in Neustadt Preußen. 1861, bei Schöner in Offen (mit 169 in den Text eingezeichneten Holzschnitten).

[illegible]

Zur Beachtung.

Da mit dieser Nummer das dritte Quartal beginnt, so ersuchen wir die geehrten Abonnenten ihre Bestellungen schnellst aufgeben zu wollen.